

Présence de symptômes	
	ከቅርብ ጊዜ ወዲህ እያሳለህ ነበር ? ከሶስት ሳምንታት በላይ? = « Est-ce que tu tousses ? Depuis plus de trois semaines ? »
	በሚያስሉበት ጊዜ ምራቅዎ ውስጥ ደም አለ? = « Quand tu tousses, y a-t-il parfois du sang dans tes crachats ? »
	በምሽት ብዙ ላብ አለብህ ? (የምሽት ላብ) = « Transpires-tu beaucoup la nuit ? »
	ትኩሳት አለብህ እና ለምን እንደሆነ አታውቅም? = « As-tu de la fièvre sans que tu ne saches pourquoi ? »
	ከብደትዎን እና የምግብ ፍላጎትዎን አጥተዋል? = « As-tu perdu du poids et n'as-tu plus envie de manger ? »
	ለተወሰነ ጊዜ የድካም ስሜት ተሰምቶህ ነበር ወይም ሃይል ማጣት ? = « Te sens-tu fatigué ou sans énergie depuis assez longtemps ? »
	በሚተነፍሱበት ወይም በሚያስሉበት ጊዜ በደረትዎ ላይ ህመም ይሰማዎታል ? = « As-tu mal dans la poitrine lorsque tu respires ou tu tousses ? »
Antécédents de TB et/ou facteurs de risque ?	
“ሳንባ ነቀርሳ(ቲቢ) ይዞህ ይውቃል? የሳንባ ነቀርሳ መድሃኒት ወስደሃል? ” = « As-tu déjà eu la tuberculose ? As-tu déjà pris des médicaments pour la TB ? »	“ሳንባ ነቀርሳ ካለባት ሰው ጋር ተገናኝተህ ታውቃለህ? ” = « As-tu déjà été en contact avec quelqu'un malade de la TB ? »
“በህመም እየተሰቃዩ ነው ወይንስ በአሁኑ ጊዜ ለአንዳንድ ማይክሮቦች ተጋላጭነት እንዲሰማዎት የሚያደርግ መድሃኒት እየወሰዱ ነው? ” = « Souffres-tu d'une maladie ou prends-tu un médicament qui te rend plus fragile aux microbes ? »	“ወደ ሊቢያ ተጉዘህ ታውቃለህ? እዚያ ለምን ያህል ጊዜ ቆየህ ? ” = « As-tu transité par la Libye ? Combien de temps ? »
Suspicion ➔ référer pour examen clinique et/ou RX thorax	