


من يقوم بالفحص؟

• الاشخاص الذين كانوا على اتصال بمريض مصاب بالسل المعدي.

• الاشخاص المعرضون لخطر الإصابة بمرض السل خلال أنشطتهم.



ما هو العلاج؟

إذا كنا في مرحلة الإصابة بالسل الخافي

يكن للطبيب أن يصف علاج وقائي ليس للشفاء (ألننا لسن مرضي) ولكن لتقليل خطر الإصابة بمرض السل في المستقبل بالعادة نأخذ دواء أو دوائين مضادات حيوية كل يوم لمدة تتراوح بين 3 و 6 أشهر

Nicotibine و/ أو Rifampicine

إذا تم تأكيد مرض السل

العلاج ضروري. العلاج طويل، 6 أشهر

علا الأقل، وهو عبارة عن أخذ

عدت ادوية كثيره (مضاد

حيوي) كل يوم. تقريبا

100% من الحالات تتعالج

إذا تم اتخاذ الأدوية

بطريقة صحيحة.



اتصلوا بنا

Fonds des Affections Respiratoires asbl
جمعية صندوق الالتهابات التنفسية

الفريق المركزي

Rue Haute, entrée 290 - 807A
1000 Bruxelles

Tél.: 02 512 29 36 - Fax : 02 511 14 17
prevention.tuberculose@fares.be

مركز الوقاية من السل بروكسل

Tél.: 02 538 05 95
cpt.bruxelles@fares.be

مركز Hainaut الوقاية من السل في

Tél.: 071 31 35 04
cpt.hainaut@fares.be

مركز Liège الوقاية من السل في

Tél.: 0474 57 16 98 / 0474 57 17 24
cpt.liege@fares.be

مركز Luxembourg الوقاية من السل في

Tél.: 0474 57 17 28
cpt.luxembourg@fares.be

مركز Namur et Brabant Wallon الوقاية من السل في

Tél.: 0474 57 17 10 / 0476 96 28 27
cpt.namur-brabantwallon@fares.be




Fonds des affections respiratoires asbl

المعلومات
للمزيد من

www.fares.be



مرض السل... الغير معروف



Fonds des affections respiratoires asbl

« ما هو مرض السل؟ »

مرض السل عبارة عن مرض يسببه **ميكروب** اسمه المتفطرة السلبيّة أو **عصية كوخ**. يهاجم غالبا الرئتين ولكن يمكن أن يصل أيضًا إلى أجزاء أخرى من الجسم مثل العظام والأمعاء والكليتين والسحايا ...

« من يؤدي به؟ »

السل الرئوي مرض **معد**.




عندما يمرض شخص،
العصية كوخ الموجودة
في رئتيه تنتشر في
الهواء من خلال السعال،
الكلام أو العطس! إذا
استنشقنا هذا الهواء
نستنشق في نفس
الوقت الجراثيم.

لهذا أي شخص يمكنه أن **يصاب به**.
بعض الأشخاص عندهم احتمال أكبر بالإصابة
بالمرض. هذا مرتبط بالاحتكاك المتواصل
بالمريض، وبأسلوب الحياة أو نوع العمل.

« ما هو الفرق بين الإصابة بالسل »

والسل النشط؟



عندما تصل عصية كوخ إلى الرئتين ، غالبا
يقضى عليها نظام - اية الجسم
إذا بقيت عصية كوخ في الجسم
تكون بصفة عامة " نائمة " لذلك فهي
ليست خطيرة. في هذه المرحلة
التي تعادل **الإصابة بالسل الخافي** لا
نكون مرضى ولا معديين.

إذا كانت حماية الجسم غير كافية (بسبب
الشيخوخة، صغر السن أو الضعف)، فيمكن لعصية
كوخ أن تستيقظ، وتتضاعف فتسبب **مرض السل**.

في هذه اللحظة تظهر العلامات التالية إذا كان
السل في الرئتين:

- السعال
- البصق (أحيانا بالدم)
- التعب
- الحمى
- العرق الليلي
- فقدان الوزن

في هذه الحالة يجب أن نذهب في
أسرع وقت ممكن إلى الطبيب.



التعب



الحمى



العرق الليلي



فقدان الوزن

« كيف يتم فحص السل؟ »

حقنة **التوبركولين** تحت الجلد تمكن بمعرفة
الإصابة بعصية كوخ. إذا كان الأمر كذلك
نلاحظ بعد مرور 3 أو 5 أيام ظهور تفاعل
محلي. يسما هذا **اختبار السل الجلدي**
ويجب ان يفسره اختصاصي صحي.

إذا كان الاختبار ايجابيا، علينا أن نأخذ
صورة لرئتين:

- « إذا كانت الصورة عاديه، أصبنا **بالسل الخافي**.
- « خلاف ذلك، سيتم اجراء فحوصات إضافية
(تحقق من وجود عصية كوخ في البلغم)
من أجل تشخيص **مرض السل الرئوي**.



السعال



البصق